



# Charlotte Bülow

Speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme

1 (1)

Frederiksberg Allé 21 A, st. (hjørneindgang), 1820 Frederiksberg C

Tlf: 3819 2026, man og tor 9-14, ons 11-16, tir 9-13 og fre lukket

## Behandling af mavesårsbakterier (*Helicobacter pylori*):

### 1.kur - Eradikering:

- Antibiotika tages to gange dagligt i 7 dage ( / -20 - / -20 ).
  - Imadrax 1 g (1 tbl.) samt
  - Klacid 500 mg (1 tbl.)
- Mavesyre medicin tages én gang dagligt i 14 dage ( / -20 - / -20 ).
  - Pantoprazol 40 mg (1 tbl.)
- Afføringsprøve 6 uger efter endt behandling ( obs. du skal holde pause med Pantoloc/pantoprazol 2 uger før denne undersøgelse – det vil sige fra / - 20 ).

Min sygeplejerske giver dig al relevant information om afføringsprøven og du får udleveret de ting, du skal bruge til det. Du og min sygeplejerske aftaler, hvordan du får svaret på afføringsprøven.

Hvis afføringsprøven igen er positiv efter denne kur, skal du sættes i behandling med en speciel kur med tre typer antibiotika og mavesyre medicin.

Du får en særskilt instruks om dette, hvis det bliver relevant.

Hvis afføringsprøven fortsat er positiv efter specialkuren med 3 typer antibiotika, er der som oftest ikke yderligere muligheder for at udrydde bakterien i speciallægepraksis. Det kan dog være, at jeg vil vælge at henvise dig til et hospital med henblik på yderligere behandlingsforslag og prøvetagning.

Kan bakterien ikke udryddes, bliver du tilbudt ny gastroskopi hvert 2. år med prøvetagning, da bakterien i meget sjældne tilfælde kan medføre celleforandringer i mavesækken og endnu sjældnere udvikling af kræft i mavesækken.

Med venlig hilsen

Charlotte Bülow, speciallæge

Instruks revideret 1.10.25, næste revision 1.10.28