



Charlotte Bülow

Speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme

1 (2)

Frederiksberg Allé 21 A, st. (hjørneindgang), 1820 Frederiksberg C

Tlf: 3819 2026, man og tor 9-14, tir 9-13, ons 11-17 og fre lukket

Patientvejledning: GASTROSKOPI

Kære

Du har tid til gastroskopi dag den / - 20 kl.

Ved en gastroskopi undersøges spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen med en tynd bøjelig kikkert.

For at undersøgelsen kan gennemføres, er det **meget vigtigt**, at mavesækken er tom. Det betyder, at du ikke må spise de sidste 6 timer før undersøgelsen, men du må gerne drikke vand og saftvand (ikke mælkeprodukter) frem til 4 timer før undersøgelsen. Du må gerne børste tænder. Nødvendige tabletter kan dog sluges med en smule vand. Du må heller ikke tygge tyggegummi eller ryge (det danner en del væske i mavesækken og forøger risikoen for at hoste under undersøgelsen) 6 timer før undersøgelsen.

Du vil blive tilbudt lokalbedøvende spray i svælget, som dæmper svælgreflexerne. I så fald må du først spise og drikke 1 time efter undersøgelsen, da der ellers er risiko for at få mad og drikke i den gale hals. Du kan efter en time forsigtigt tage en mundfuld vand og sikre dig, at der ikke er problemer med at synke. En eventuel tandprotese skal tages ud under undersøgelsen.

Under undersøgelsen skal du ligge på venstre side. Du får en tandbeskytter i munden. Den bøjelige kikkert (gastroskop) er på tykkelse med en tynd lillefinger og den føres ind bag ved tungen og ned i spiserøret og videre ned i mavesækken og tolvfingertarmen. Når kikkerten skal føres ned i spiserøret, vil du blive bedt om at lave en synkebevægelse. Det er vigtigt, at du koncentrerer dig om din vejrtrækning og trækker vejret dybt og roligt under hele undersøgelsen. Undersøgelsen varer højst 5 minutter og gør ikke ondt, men nedføringen gennem svælget og spiserøret kan medføre ubehag. Der pustes luft ned i mavesækken under undersøgelsen og det kan medføre trykken i maven og trang til at bøvse. Mest mulig af luften suges ud igen ved undersøgelsens afslutning. Der kan tages vævsprøver og bakterieprøver under undersøgelsen og dette er helt smertefrit.

Efter undersøgelsen taler vi om resultatet og om den videre behandling.

Komplikationer:

Komplikationer til undersøgelsen er yderst sjældne og kan være blødning efter vævsprøver og perforation af spiserøret. Begge dele kan medføre indlæggelse til behandling og eventuelt operation.

VIGTIGT!:

Hvis du er i behandling med **blodfortyndende medicin** (magnyl, persantin, clopidogrel/plavix eller marevan) eller har **pacemaker**, skal du oplyse om dette ved tidsbestillingen eller ringe os op og fortælle det, når du har læst disse papirer. Fiskeolie/Omega 2 skal også pauseres 5 dage før undersøgelsen, da det virker blodfortyndende.

OBS!:

Udeblivelse uden afbud vil (efter aftale med De danske Regioner) medføre en regning på 250 kr. for udeblivelse fra konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra operation eller undersøgelse. Rykkergebyr koster yderligere 100 kr.

Med venlig hilsen og på gensyn

Charlotte Bülow

Speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme

Instruks revideret 1.10.25. Næste revision 1.10.28